



新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始致しますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

抗 RNA ポリメラーゼ 抗体

(依頼コード No.2198)

受託開始日 2011年2月1日(火) 受付分より

全身性強皮症(Systemic Sclerosis : SSc)は皮膚硬化のほか、内臓にも病変が現れる疾患で、皮膚硬化範囲からびまん型(diffuse型)と限局型(limited型)に分類されます。

皮膚硬化が広範囲におよび肺線維症を伴うびまん型では抗トポイソメラーゼ 抗体(抗Scl-70抗体)、内臓病変が少なく比較的軽症の限局型では抗セントロメア抗体などの自己抗体が検出されます。

抗RNAポリメラーゼ 抗体は、びまん型の強皮症に特異性が高く、他の自己抗体と共存する例が少ないこと、陽性例で強皮症腎クリーゼを高率に併発することなどから、全身性強皮症の診断補助や治療方針決定に際し、有用な情報を提供します。

受託要領

依頼コードNo.	2198
統一コード	5G087-0000-023-023
検体必要量	血清 0.2mℓ
検体の保存方法	冷蔵
採取容器	B - 1 S - 1
測定方法	EIA法
基準値	28.0未満
単位	なし(Index値)
報告範囲	5.0未満～150.0以上
報告桁	小数第1位
報告日数	2～8日
検査実施料/判断料	170点/144点(免疫学的検査)

判定基準

Index値	判定
28.0未満	(-)
28.0以上50.0未満	(±)
50.0以上	(+)

【測定方法の参考文献】 掛川真弓, 他: 医学と薬学, 64(2): 295-299, 2010.